

- Règlement
- Politique
- Pratique de gestion

Approbation : Direction générale
Résolution : Sans objet
Responsable : Direction des ressources éducatives
Date d'approbation : 2015-12-11
Date d'entrée en vigueur :
Date prévue de révision : au besoin
Date d'annulation :
Date de l'avis public préalable : Sans objet
Date de l'avis public d'adoption : Sans objet

Liste des écrits de gestion remplacés :

Consultations effectuées :

Date des amendements :

Table des matières

Soins reliés à l'anaphylaxie en milieu scolaire	
• Introduction.....	3
L'allergie	
• Qu'est-ce qu'une allergie alimentaire?.....	4
• Qu'est-ce que l'anaphylaxie?.....	4
• Signes et symptômes.....	4
• Les causes de l'anaphylaxie.....	4
• Attention à la contamination croisée.....	4
• Facteurs susceptibles d'augmenter le risque d'une réaction anaphylactique grave.....	5
• Excursions scolaires.....	5
• Anaphylaxie après exposition au venin d'insectes.....	5
Rôles et responsabilités des différentes personnes concernées par l'anaphylaxie	
• Parents de l'enfant ayant des allergies à réaction anaphylactique.....	6
• Enfant ayant des allergies à réaction anaphylactique.....	7
• Direction d'école.....	8
• Enseignant de la classe.....	9
• Enseignants suppléants, parents bénévoles, et autres personnes ayant des contacts occasionnels.....	10
• Éducateur du service de garde.....	10
• Infirmière en santé scolaire.....	11
• Exploitants d'autobus et conducteurs d'autobus scolaire.....	11
• Autres parents.....	11
• Tous les autres élèves.....	12
• Services alimentaires.....	12
• Écoles secondaires.....	12
Formation sur les soins reliés à l'anaphylaxie en milieu scolaire	
• Activité 1 : Formation du personnel scolaire.....	13
• Activité 2 : Formation des conducteurs d'autobus.....	14
Plan d'intervention d'urgence	
• Procédures.....	16
• Emplacement des auto-injecteurs d'épinéphrine.....	16
• Examen périodique.....	16
ANNEXE 1 : Questionnaires et consentements	
• Lettre d'accompagnement du questionnaire.....	18
• Questionnaire : Raison de l'intervention : Allergie.....	19
• Protocole d'anaphylaxie.....	21
ANNEXE 2 : Modèles de lettres aux parents	
• Lettres.....	23
ANNEXE 3 : Outils divers	
• Comment utiliser l'auto-injecteur d'épinéphrine EpiPen.....	28
• Comment utiliser l'auto-injecteur d'épinéphrine Twinject.....	29
• Comment utiliser l'auto-injecteur d'épinéphrine Allerject.....	29
• Procédures en cas d'urgence.....	30
• Protocole pour les appels 911 Anaphylaxie.....	31
• Intervention lors d'anaphylaxie.....	32

SOINS RELIÉS À L'ANAPHYLAXIE EN MILIEU SCOLAIRE

INTRODUCTION

Constatant la présence en milieu scolaire d'enfants atteints d'allergies sévères de type anaphylactique, nous avons procédé à la mise à jour du protocole d'intervention. Ce protocole vise à outiller les intervenants du milieu scolaire afin qu'ils puissent intervenir efficacement lors d'une situation d'urgence.

Il fait appel à la participation de l'enfant, de ses parents, de la direction, du personnel scolaire, du transporteur scolaire, du service de garde, du service alimentaire et de l'infirmière.

Le protocole de premiers soins a été largement inspiré du document « *Guide de l'anaphylaxie à l'intention des commissions et conseils scolaires* », de l'Association canadienne des commissions scolaires/conseils scolaires.

Des mesures de promotion et de prévention sont incluses dans le document. Éviter le contact avec un produit allergène est la mesure la plus efficace afin d'assurer la sécurité des enfants allergiques de type anaphylactique, dans les écoles de notre région.

L'ALLERGIE

QU'EST-CE QU'UNE ALLERGIE ALIMENTAIRE?

Une allergie alimentaire est une réaction spécifique ou une sensibilité de l'organisme à une protéine alimentaire particulière. Une réaction allergique survient lorsque l'aliment qui cause une réaction est consommé, aspiré ou touché.

QU'EST-CE QUE L'ANAPHYLAXIE?

L'anaphylaxie est une réaction allergique grave qui peut entraîner l'inconscience, le coma et la mort.

SIGNES ET SYMPTÔMES :

- **Peau** - urticaire, enflure, démangeaisons, chaleur, rougeur, éruptions;
- **Système respiratoire** – respiration sifflante, essoufflement, étouffement, toux, voix rauque, douleur ou serrement dans la poitrine, congestion nasale ou symptômes du rhume des foins (nez qui coule ou qui pique, larmoiement, éternuements), difficulté à avaler;
- **Système gastro-intestinal (estomac)** – nausée, douleur ou crampes, vomissements, diarrhée;
- **Système cardiovasculaire (cœur)** – couleur pâle ou bleutée, pouls faible, perte de conscience, étourdissement, vertige, état de choc.

LES CAUSES DE L'ANAPHYLAXIE

Groupes d'aliments, c'est-à-dire :

- Les arachides, les noix (amandes, noix du Brésil, cajous, noix de macadamia, noisettes ou avelines, pacanes, pignons, pistaches);
- Le lait de vache;
- Les œufs;
- Le poisson, les crustacés et coquillages, fruits de mer et mollusques;
- Le soja, le blé et les graines de sésame;
- Les sulfites;
- Certains fruits.

Autres allergies

- Le venin des guêpes jaunes, guêpes, abeilles et frelons
- Les médicaments
- Le latex

ATTENTION À LA CONTAMINATION CROISÉE

Les réactions allergiques alimentaires sont potentiellement mortelles. Il est possible de les prévenir en évitant tout contact avec l'aliment allergène. Malheureusement, les personnes

allergiques entrent souvent en contact avec des produits contaminés par l'allergène. La contamination survient lorsqu'un aliment sans danger vient en contact avec une substance allergène (ex. : surface de cuisson, micro-ondes, table ou ustensiles qui sont mal nettoyés).

FACTEURS SUSCEPTIBLES D'AUGMENTER LE RISQUE D'UNE RÉACTION ANAPHYLACTIQUE GRAVE

L'anaphylaxie et l'asthme

Les personnes qui souffrent d'asthme et qui ont reçu un diagnostic d'anaphylaxie sont plus susceptibles d'éprouver de graves problèmes respiratoires lors d'une réaction anaphylactique. Enfin, ces personnes doivent avoir sur elles leurs médicaments contre l'asthme (pompes ou inhalateurs) avec leur auto-injecteur d'épinéphrine (EpiPen , Allerject et Twinject).

EXCURSIONS SCOLAIRES

En plus des précautions de sécurité habituelles que l'école applique lors des excursions scolaires, il importe de prévoir les procédures qui suivent afin de protéger l'enfant anaphylactique.

- Inclure dans les formulaires d'autorisation et d'inscription, une section distincte pour les «problèmes médicaux graves». Dans cette section, prévoir les détails relatifs aux allergènes, aux symptômes et au traitement de l'élève anaphylactique. Une copie de ce formulaire doit être accessible en tout temps durant l'excursion;
- Exiger que la personne responsable de l'enfant anaphylactique connaisse les allergènes en cause, les symptômes à surveiller et le traitement ainsi que l'utilisation d'un auto-injecteur;
- Veiller à ce que les responsables aient accès à un téléphone, un téléphone cellulaire ou un appareil radio pour communiquer en cas d'urgence;
- Prévoir au moins deux auto-injecteurs pour administrer à toutes les 10 à 15 minutes lors du transport vers l'hôpital le plus proche, au cas où les symptômes persisteraient ou réapparaîtraient;
- Analyser les facteurs de risque lorsque ceux-ci sont trop grands pour être contrôlés, il se peut que l'enfant anaphylactique ne puisse pas participer à l'excursion. Les parents prendront part à cette décision.

ANAPHYLAXIE APRÈS EXPOSITION AU VENIN D'INSECTES

- Éviter les vêtements amples, les motifs floraux, le bleu et le jaune, et les parfums;
- Vérifier qu'il n'y a pas d'abeilles ou de guêpes dans les environs. Si l'on constate la présence de ces insectes, surtout de leurs nids, prendre les mesures nécessaires pour leur enlèvement;
- Lorsqu'on consomme des boissons gazeuses à l'extérieur, verser le contenu de la canette dans un gobelet avant de boire et jeter les canettes dans un récipient muni d'un couvercle;
- Veiller à ce que les déchets soient conservés dans des récipients munis de couvercles.

En cas de piqûres d'insectes, ne jamais frapper ou tenter d'enlever l'insecte, et ne jamais tenter de pincer le dard. L'enlever plutôt avec l'ongle ou une carte plastifiée.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES DIFFÉRENTES PERSONNES CONCERNÉES PAR L'ANAPHYLAXIE DANS LES ÉCOLES ET LES SERVICES DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE

PARENTS DE L'ENFANT AYANT DES ALLERGIES À RÉACTION ANAPHYLACTIQUE

PRÉVENTION	COMMUNICATION	MESURES D'URGENCE
<ul style="list-style-type: none"> • Assurer un soutien à l'école et à l'enseignant sur demande. • Participer à l'élaboration d'un plan d'action d'urgence pour leur enfant. • Préparer des aliments sûrs pour des occasions spéciales. • Remplir les formulaires requis (fiche-santé, fiche d'identification de l'enfant allergique avec photo récente). • Procurer à l'enfant, si possible, un bracelet Medic-Alert indiquant ce à quoi il est allergique. • Accueillir positivement les appels des autres parents ayant des questions sur les aliments sûrs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informer l'école et le chauffeur d'autobus des allergies de leur enfant. • Enseigner à l'enfant : <ul style="list-style-type: none"> ➤ son allergie et les aliments qu'il doit éviter. ➤ à reconnaître les symptômes avant-coureurs d'une réaction anaphylactique. ➤ à s'informer de l'endroit où se trouve son médicament et qui peut l'obtenir. ➤ à s'exprimer clairement lorsqu'il sent le déclenchement d'une réaction. ➤ à ne pas partager de goûters, de repas ou de boissons. ➤ à se laver les mains fréquemment. ➤ à réagir de manière appropriée aux taquineries et à l'isolement. ➤ à signaler les menaces et les tentatives d'intimidation à un adulte d'autorité. • Informer l'école de tout changement dans l'état de santé de leur enfant. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fournir à l'école des dispositifs d'injection non périmés et les renouveler au besoin. • S'assurer que le médicament de l'enfant : <ul style="list-style-type: none"> ➤ soit bien identifié au nom de leur enfant. ➤ soit dans son contenant original si possible et le cas échéant que la date d'expiration ainsi que le dosage requis se retrouvent avec le médicament.

ENFANT AYANT DES ALLERGIES À RÉACTION ANAPHYLACTIQUE

PRÉVENTION	COMMUNICATION	MESURES D'URGENCE
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Apprendre à connaître et reconnaître les aliments à éviter.</u> • Se conscientiser et se responsabiliser face aux précautions à ses allergies. • Ne consommer que les aliments apportés de la maison ou ceux qu'il est autorisé à manger. • Prendre la responsabilité de vérifier les étiquettes et de surveiller l'apport alimentaire (en fonction du développement de l'enfant). • Se laver les mains avant et après avoir mangé. • Savoir comment utiliser son auto-injecteur (selon le développement de l'enfant). • Apprendre à reconnaître les symptômes d'une réaction anaphylactique (selon le développement de l'enfant). • Porter son bracelet Medic-Alert (si disponible). • Ne pas partager les instruments de musique que l'on porte à la bouche. • Éviter de participer à l'enlèvement des déchets, aux campagnes de nettoyage de la cour ou aux activités qui risquent l'exposition à des emballages, des contenants ou des débris d'aliments. • Prendre des précautions durant les heures de repas, par exemple: <ul style="list-style-type: none"> - Ne pas déposer sa nourriture directement sur la table ou le pupitre (mettre une serviette de papier); - Sortir un aliment à la fois afin d'éviter les risques de contamination. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informer rapidement un adulte dès l'exposition accidentelle ou dès l'apparition de symptômes. • Informer les adultes et les compagnons de classe de ses allergies. 	<ul style="list-style-type: none"> • Garder un auto-injecteur à sa portée en tout temps (ex : ceinture de taille) ou savoir exactement où celui-ci se trouve (sac d'école, boîte à lunch).

DIRECTION DE L'ÉCOLE

PRÉVENTION	COMMUNICATION	MESURES D'URGENCE
<ul style="list-style-type: none"> • Tenir une liste à jour des membres du personnel ayant suivi la formation concernant l'anaphylaxie. • Veiller à ce que les suppléants soient informés de la présence d'un élève ayant une allergie de type anaphylactique dans la classe. • Collaborer avec le parent de l'enfant ayant des allergies. • Veiller à ce que les parents remplissent les formulaires requis. • Soutenir l'infirmière en santé scolaire pour mettre en application la procédure préalablement élaborée. • Doter le service de garde et la cafétéria de micro-ondes strictement réservés aux élèves ayant des allergies et identifiés sans allergène. • Établir une procédure disciplinaire en cas d'intimidation ou de menaces. 	<ul style="list-style-type: none"> • Veiller à ce que tous les enseignants, les bénévoles, les suppléants, le personnel de soutien, les membres du service de garde aient reçu la formation sur l'utilisation de l'auto-injecteur, et ce, à chaque début d'année. • Informer tous les membres du personnel de l'emplacement des auto-injecteurs. • Informer tous les parents qu'un élève souffrant d'une allergie potentiellement mortelle fréquente l'école et demander leur collaboration. • Informer le conducteur de l'autobus scolaire de la présence à bord d'un enfant ayant des allergies potentiellement mortelles. • Afficher clairement dans une aire commune (salle du personnel) la liste d'enfants allergiques fréquentant l'école. • Installer près de tous les téléphones les procédures d'urgence. • Veiller à ce que des procédures soient en place afin d'informer les suppléants et les bénévoles de la présence d'élèves anaphylactiques. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conserver les auto-injecteurs dans un endroit facile d'accès et les renouveler lorsque périmés. • Établir des procédures de sécurité pour les excursions scolaires et les activités parascolaires. • Veiller à ce qu'il y ait toujours la présence d'un adulte habilité à administrer l'auto-injecteur d'épinéphrine à l'école, et même pendant les sorties éducatives.

ENSEIGNANT

PRÉVENTION	COMMUNICATION	MESURES D'URGENCE
<ul style="list-style-type: none"> • Connaître le nom des enfants à risque de réaction anaphylactique, l'emplacement de l'auto-injecteur, les mesures de prévention et le traitement d'urgence de son groupe classe. • Informer et encourager les élèves à ne pas partager leur repas ou à échanger de la nourriture. • Choisir des aliments sûrs pour les activités spéciales en classe. • Veiller à ce que les parents remplissent les formulaires requis et les retournent avec les pièces demandées (photo de l'enfant et signature des parents). • Participer à la formation interne annuellement. • Respecter les politiques de l'école visant à réduire les risques dans les salles de classe et dans les aires communes. • Veiller à bien nettoyer les tables et autres surfaces servant aux heures de repas ou de collation. • Rester à l'affût de la présence d'allergènes dans le matériel pédagogique, notamment : <ul style="list-style-type: none"> ➤ La pâte à modeler; ➤ Les sièges-sacs, les animaux en peluche (parfois remplis de coques d'arachide); ➤ Les aides scolaires pour apprendre à compter (fèves, pois); ➤ Les jouets, livres et autres articles ayant pu être contaminés durant l'utilisation; ➤ Les projets de science; ➤ Les activités saisonnières spéciales, telles les œufs de Pâques et les projets de jardinage. • Veiller à ce que les enfants anaphylactiques soient éviter de participer à l'enlèvement des déchets, aux campagnes de nettoyage de la cour ou aux activités qui risquent de les exposer à des emballages, des contenants ou des débris d'aliments. 	<ul style="list-style-type: none"> • Discuter en classe de l'anaphylaxie, et des symptômes de celle-ci en termes adaptés au groupe d'âge. • Renseigner les élèves sur l'importance de se laver les mains avant et après avoir mangé. • Conserver bien en vue l'information relative aux allergies de l'élève anaphylactique et aux mesures d'urgence. 	<ul style="list-style-type: none"> • Respecter le plan d'urgence de l'école • Préparer soigneusement les excursions : <ul style="list-style-type: none"> ➤ veiller à préparer un plan d'action d'urgence. ➤ s'assurer d'avoir des auto-injecteurs disponibles. ➤ veiller à l'accessibilité d'un téléphone ou d'un moyen de communication en cas d'urgence. • Avoir un avis médical ou celui de l'infirmière scolaire pour les sorties et excursions (au besoin).

ENSEIGNANTS SUPPLÉANTS, PARENTS BÉNÉVOLES, ET AUTRES PERSONNES AYANT DES CONTACTS OCCASIONNELS

PRÉVENTION	COMMUNICATION	MESURES D'URGENCE
<ul style="list-style-type: none"> • Participer à la formation interne sur les mesures d'urgence. • Prendre connaissance des documents d'informations disponibles dans la classe. 	<ul style="list-style-type: none"> • Consulter l'information transmise par l'enseignant (te) relative aux allergies de l'élève anaphylactique et aux mesures d'urgence. 	<ul style="list-style-type: none"> • Respecter le plan d'urgence de l'école. • Respecter les mesures mises en place.

ÉDUCATEUR DU SERVICE DE GARDE ET SURVEILLANT DES HEURES DE DÎNER

PRÉVENTION	COMMUNICATION	MESURES D'URGENCE
<ul style="list-style-type: none"> • Connaître le nom des enfants à risque de réaction anaphylactique, l'emplacement de l'auto-injecteur, les mesures de prévention et le traitement d'urgence de son groupe d'enfants. • Participer à la formation interne annuellement. • Informer et encourager les élèves à ne pas partager leur repas ou à échanger de la nourriture. • Choisir des aliments sûrs pour les activités spéciales. • Suivre les politiques de l'école visant à réduire les risques dans les salles de classe et dans les aires communes. • Veiller à bien nettoyer les tables et autres surfaces servant aux heures de repas ou de collation. • S'assurer que l'enfant à risque d'anaphylaxie n'ait jamais la responsabilité de nettoyer les tables. • Avoir des micro-ondes à la disposition des élèves ayant des allergies identifiées sans allergène. 	<ul style="list-style-type: none"> • Renseigner les élèves sur l'importance de se laver les mains avant et après avoir mangé. • Aviser l'élève ayant des allergies de ne pas déposer de nourriture directement sur la table. • Installer un papier à main ou un napperon comme sous plat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Préparer soigneusement les excursions : <ul style="list-style-type: none"> ➤ veiller à préparer un plan d'action d'urgence. ➤ s'assurer d'avoir des auto-injecteurs disponibles. ➤ veiller à l'accessibilité d'un téléphone ou d'un moyen de communication en cas d'urgence. • Avoir un avis médical ou celui de l'infirmière scolaire pour les sorties et excursions (au besoin).

INFIRMIÈRE SCOLAIRE DU CISSS

PRÉVENTION	COMMUNICATION	MESURES D'URGENCE
<ul style="list-style-type: none"> • Identifier les élèves ayant des allergies graves suite au bilan de santé. • Faire la collecte de données des enfants ayant des allergies. • Mettre en place le protocole. • Participer à la planification des politiques scolaires. • Procéder à la séance de formation interne sur l'utilisation des auto-injecteurs. Élaborer les différents plans d'intervention d'urgence (ex : voyage de fin d'année). 	<ul style="list-style-type: none"> • Fournir de l'information aux parents, aux élèves et aux membres du personnel de l'école. • Signaler à la direction de l'école les cas connus d'anaphylaxie ainsi que les nouveaux cas. • Aviser tous les employés de l'école en contact avec l'enfant allergique. • Collaborer avec l'équipe-école : les soutenir, répondre à leurs questions et inquiétudes. 	<ul style="list-style-type: none"> • S'assurer que l'auto-injecteur appartenant à l'école n'est pas périmé. • Vérifier que la médication des élèves soit dans les contenants originaux ou clairement identifiés.

EXPLOITANTS D'AUTOBUS ET/OU CONDUCTEURS D'AUTOBUS SCOLAIRE

PRÉVENTION	COMMUNICATION	MESURES D'URGENCE
<ul style="list-style-type: none"> • Désigner une place réservée à l'élève anaphylactique, de préférence près de l'avant de l'autobus (surtout pour les élèves plus jeunes). • Participer à la formation annuelle obligatoire organisée par le CSSS: • Avoir à bord de l'autobus, bien en évidence, un exemplaire de la formule d'alerte-urgence. remis par la direction d'école • Participer à l'élaboration d'un plan d'action d'urgence lié directement au transport par autobus. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informer les enfants qu'il est strictement défendu de manger de la nourriture pendant le trajet afin de réduire au minimum le risque encouru par l'élève ayant des allergies pendant les trajets d'autobus. 	<p>Mettre en application au besoin le plan d'action d'urgence. Ce plan doit comporter :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une stratégie de communication rapide soit radio, soit téléphone cellulaire; • L'accès à des auto-injecteurs; • La disponibilité d'un adulte formé à la procédure d'urgence.

AUTRES PARENTS

PRÉVENTION	COMMUNICATION	MESURES D'URGENCE
<ul style="list-style-type: none"> • Collaborer aux demandes de l'école afin d'éliminer les allergènes des goûters et des repas préparés à l'avance. • Participer aux séances d'information à l'intention des parents. 	<ul style="list-style-type: none"> • Encourager leur enfant à respecter l'élève ayant des allergies à risque d'anaphylaxie et suivre les politiques de l'école. • Informer l'enseignant avant de distribuer des aliments à tout enfant fréquentant l'école. 	

TOUS LES AUTRES ÉLÈVES

PRÉVENTION	COMMUNICATION	MESURES D'URGENCE
<ul style="list-style-type: none">• Éviter de partager ses aliments.• Apprendre à reconnaître les symptômes de la réaction anaphylactique (selon l'âge de l'enfant).• Suivre les règlements de l'école en ce qui concerne l'élimination des allergènes dans la salle de classe et le lavage des mains.• Ne pas intimider ou taquiner un élève ayant une allergie.		

SERVICES ALIMENTAIRES

PRÉVENTION	COMMUNICATION	MESURES D'URGENCE
<ul style="list-style-type: none">• S'assurer que leur personnel reçoive la formation nécessaire pour réduire le risque de contamination croisée lors de l'achat, de la manutention, de la préparation et du service de la nourriture.• Identifier clairement les ingrédients des aliments servis à la cafétéria scolaire ou apportés à l'école lors d'un événement spécial.		Prendre connaissance de la liste d'élèves allergiques transmises par l'infirmière.

ÉCOLES SECONDAIRES

PRÉVENTION	COMMUNICATION	MESURES D'URGENCE
<ul style="list-style-type: none">• Encourager l'élève à porter un auto-injecteur et veiller à ce qu'un second auto-injecteur soit disponible au bureau de l'administration.• Les élèves asthmatiques doivent idéalement avoir leur inhalateur (bleu) avec eux.	<ul style="list-style-type: none">• Encourager les élèves à signaler immédiatement toute exposition accidentelle ou réaction imminente, afin de permettre au personnel de les assister sans attendre.	<ul style="list-style-type: none">• Recommander à l'élève de choisir une ou un camarade qui sera informé en cas de réaction et pourra demander de l'aider au besoin.• L'encourager à garder l'auto-injecteur à sa portée.

Toute information médicale concernant un élève doit être traitée d'une façon respectueuse et confidentielle.

Les renseignements contenus dans le dossier de santé scolaire ne sont pas accessibles au personnel de l'école ou du service de garde, sauf si les parents l'autorisent par écrit.

FORMATION SUR LES SOINS RELIÉS À L'ANAPHYLAXIE EN MILIEU SCOLAIRE

Activité 1

Formation du personnel scolaire sur les allergies sévères et l'utilisation de l'auto-injecteur d'épinéphrine.

Clientèle visée :

Personnel scolaire œuvrant auprès des jeunes.

Objectifs généraux de l'activité :

- Prévenir l'apparition de réactions anaphylactiques pour les élèves aux prises avec des allergies sévères par la mise en place de mesures préventives;
- Assurer la mise en place d'un protocole d'urgence dans les écoles en cas de réactions allergiques sévères qui requièrent l'administration de l'épinéphrine.

Objectifs spécifiques :

- Connaître ce qu'est une allergie;
- Connaître les responsabilités de chacun;
- Savoir mettre en place des mesures préventives;
- Connaître les procédures à inclure dans un plan d'action d'urgence;
- Savoir exécuter au besoin le plan d'urgence.

Recommandation :

Formation annuelle pour le personnel œuvrant auprès des jeunes.

Engagements des parties :

- La CSPN informe les directions d'école de l'obligation de la formation et des procédures à suivre pour inscrire leur personnel à la formation et collabore avec le CISSS des Laurentides, Installation Antoine-Labelle Celui-ci offre et dispense la formation auprès du personnel scolaire et collabore avec la Commission scolaire Pierre-Neveu dans la réalisation de cette activité.

Procédures de réalisation :

- La direction de l'école convient avec l'infirmière scolaire du moment jugé opportun pour dispenser la formation;
- La direction de l'école informe le personnel de la date, l'heure et le lieu de la formation;
- Au courant de l'année scolaire, après entente entre la direction de l'école et l'infirmière scolaire, de nouvelles formations pourront être données au personnel n'ayant pas reçu la formation, ex. : arrivée de nouveau personnel.

Mécanisme de suivi de cette activité :

La présente activité est reconduite automatiquement à moins que les parties n'en conviennent autrement.

Activité 2

Formation des conducteurs d'autobus sur les allergies sévères et l'utilisation de l'auto-injecteur de l'épinéphrine.

Clientèle visée :

Conducteurs d'autobus scolaire.

Objectifs généraux de l'activité :

- Prévenir l'apparition de réactions anaphylactiques pour les élèves aux prises avec des allergies sévères par la mise en place de mesures préventives;
- Assurer la mise en place d'un protocole d'urgence dans l'ensemble du transport scolaire en cas de réactions allergiques sévères qui requièrent l'administration d'épinéphrine.

Objectifs spécifiques :

- Connaître ce qu'est une allergie;
- Connaître les responsabilités de chacun;
- Savoir mettre en place des mesures préventives;
- Connaître les procédures à inclure dans un plan d'action d'urgence;
- Savoir exécuter au besoin le plan d'urgence.

Recommandation :

Formation annuelle pour tous les conducteurs d'autobus scolaire.

Engagements des parties :

- La CSPN informe les transporteurs scolaires de l'obligation de la formation et des procédures à suivre pour inscrire leur personnel à la formation et collabore avec le CISSS des Laurentides, Installation Antoine-Labelle dans la réalisation de cette activité;
- Le CISSS des Laurentides, Installation Antoine-Labelle offre et dispense la formation auprès du personnel des transporteurs scolaires et collabore avec la Commission scolaire Pierre-Neveu dans la réalisation de cette activité.

Procédures de réalisation :

- Le transporteur scolaire procède à l'inscription de ses conducteurs d'autobus à la formation dispensée par le CISSS des Laurentides, Installation Antoine-Labelle;
- Fin août, le transporteur transmet la liste de ses conducteurs au service Enfance-Famille-Jeunesse au secrétariat (819 623-1228 poste 6363), cette liste inclut le nom du conducteur, son numéro de téléphone et le numéro du transporteur ainsi que le lieu de formation désiré;
- Le CISSS des Laurentides, Installation Antoine-Labelle fournira une attestation de participation à la formation au conducteur et transmettra la liste des participants aux formations, au responsable du transport scolaire de la CSPN.

Si en cours d'année, un transporteur veut inscrire un conducteur, il le fera au même numéro de téléphone, mais la formation sera dispensée par le CISSS des Laurentides, Installation Antoine-Labelle.
--

Mécanismes de suivi de l'activité :

- Afin d'assurer le respect, la qualité et la pérennité de cette activité, une fois par année, le chef d'administration du service Enfance-Famille-Jeunesse du CISSS des Laurentides, Installation Antoine-Labelle et le responsable du transport scolaire de la Commission scolaire Pierre-Neveu, feront un suivi de l'activité.
- La présente activité est reconduite automatiquement, année après année, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

PLAN D'INTERVENTION D'URGENCE

L'enfant qui subit une réaction anaphylactique en est habituellement conscient. Les membres du personnel scolaire doivent être avertis de prendre au sérieux les dires de l'enfant. Si l'enfant se plaint de tout symptôme pouvant signaler l'apparition d'une réaction, le personnel ne doit pas hésiter à prodiguer le traitement d'urgence prévu. **Réagir trop vite ne comporte pas de danger, mais ne pas réagir assez promptement peut constituer un grave danger.**

PROCÉDURES

- Communiquer l'urgence rapidement à un membre du personnel formé à l'utilisation d'un auto-injecteur;
- Administrer l'injection. (les responsables ne doivent jamais supposer que les enfants ou adolescents procéderont eux-mêmes à l'injection. En cas de réaction, un élève anaphylactique, quel que soit son âge, peut avoir besoin d'aide à cause de l'évolution rapide des symptômes ou du stress occasionné par la situation. L'intervention d'un adulte est indispensable);
- Composer le 911 ou appeler l'ambulance. Mentionner au téléphoniste qu'un enfant subit une réaction anaphylactique;
- Transporter l'enfant à l'hôpital immédiatement, lorsque les services d'ambulance ne sont pas disponibles. Au moins un adulte doit accompagner le conducteur. (La commission scolaire doit s'assurer que la police d'assurance couvre une situation d'urgence de ce genre);
- Désigner une personne qui appellera les parents de l'enfant pour les aviser de se rendre à l'hôpital;
- Administrer l'auto-injecteur d'épinéphrine. de nouveau après 10 à 15 minutes en attendant l'ambulance, puis en route vers l'hôpital si les symptômes ne disparaissent pas ou réapparaissent;
- Remplir le formulaire « intervention lors d'anaphylaxie ».

EMPLACEMENT DES AUTO-INJECTEURS D'ÉPINÉPHRINE

- Les auto-injecteurs d'épinéphrine doivent être conservés dans un endroit sûr, non fermé à clé et d'accès facile, dans la salle de classe de l'enfant ou dans un endroit central à l'intérieur de l'école (bureau de l'administration ou salle du personnel). Bien que l'épinéphrine ne soit pas un médicament dangereux, l'injection accidentelle dans le bout du doigt, dans un vaisseau sanguin important ou dans un nerf peut entraîner un préjudice corporel;
- Dès qu'ils sont assez âgés, les élèves **doivent porter leur propre auto-injecteur sur eux;**
- Le nombre d'auto-injecteurs dépendra de la durée estimative du trajet entre l'école et l'hôpital. Il peut s'avérer nécessaire de procéder à une nouvelle injection à intervalles de 10 à 15 minutes;
- Tous les membres du personnel doivent connaître l'emplacement des auto-injecteurs.

EXAMEN PÉRIODIQUE


Les procédures d'urgence prévues par l'école pour chaque élève anaphylactique doivent être passées en revue chaque année avec le personnel et les parents. En cas d'intervention d'urgence, il importe de faire une évaluation immédiate des mesures prises, sans oublier de remplacer immédiatement les auto-injecteurs utilisés.

ANNEXE 1

QUESTIONNAIRES ET CONSENTEMENTS

PROTOCOLE D'ANAPHYLAXIE

Nom de l'élève _____ Niveau : _____



- Arachides Autre aliment, précisez : _____
 Noix Piqûre d'insecte
 Œufs Latex
 Lait

Auto-injecteur d'épinéphrine: Date de péremption : _____ / _____ / _____

- EpiPen Allerject Twinject

Où trouver les auto-injecteurs : _____

Asthme : La personne s'expose à un risque plus élevé. Si, lors d'une réaction, elle éprouve de la difficulté à respirer, lui administrer de l'épinéphrine: **avant** de lui faire prendre ses médicaments contre l'asthme.

Quiconque fait une réaction anaphylactique peut présenter N'IMPORTE LEQUEL des signes et symptômes suivants :

- **Peau** - urticaire, enflure, démangeaisons, chaleur, rougeur, éruptions.
- **Système respiratoire** – respiration sifflante, essoufflement, étouffement, toux, voix rauque, douleur ou serrement dans la poitrine, congestion nasale ou symptômes du rhume des foins (nez qui coule ou qui pique, larmolement, éternuements), difficulté à avaler.
- **Système gastro-intestinal (estomac)** – nausée, douleur ou crampes, vomissement, diarrhée.
- **Système cardiovasculaire (cœur)** – couleur pâle ou bleutée, pouls faible, perte de conscience, étourdissement, vertige, état de choc.
- **Autres symptômes** – anxiété, sentiment de détresse, mal de tête.

Intervenez rapidement. Les premiers signes d'une réaction peuvent sembler légers, mais les symptômes eux peuvent progresser rapidement

1. **Administrer** l'épinéphrine avec l'**auto-injecteur** (ÉpiPen, Allerject ou Twinject) au premier signe d'une réaction lorsqu'il y a eu ou qu'on soupçonne qu'il y a eu contact avec un allergène. Administrer une deuxième dose après 10 ou 15 minutes, **ou avant**, si la réaction persiste ou s'aggrave.
2. **Appelez le 911**. Dites que quelqu'un fait une réaction anaphylactique et demandez une ambulance immédiatement.
3. **Rendez-vous à l'hôpital le plus proche**, même si les symptômes sont légers ou se sont atténués. Le patient doit demeurer en observation à l'hôpital pendant une période suffisante, soit 4 heures généralement, suivant l'évaluation du médecin de l'urgence. La réaction pourrait réapparaître.
4. **Communiquez avec une personne à aviser en cas d'urgence.**

Personnes à aviser en cas d'urgence				
Nom	Lien avec la personne	Téléphone à la maison	Téléphone au travail	Téléphone cellulaire

Infirmière clinicienne

Date

ANNEXE 2

MODELES DE LETTRES AUX PARENTS

Date : _____

Objet : Enfant allergique

Chers parents ou tuteurs,

Un enfant dans notre école ou dans la classe de votre enfant est gravement allergique à _____ . Il pourrait subir une réaction grave et potentiellement mortelle s'il est exposé même à une quantité minuscule de ce produit. Nous avons tous un rôle à jouer afin de prévenir une situation dangereuse et dramatique à l'école. L'enfant allergique ainsi que sa famille assument la responsabilité d'éviter l'exposition à l'allergène. Cependant, le personnel de l'école ainsi que les autres enfants et leurs familles peuvent également contribuer à rendre l'environnement scolaire plus sécuritaire. Nous demandons votre collaboration en prenant les mesures suivantes :

- Veuillez vérifier la liste des ingrédients des produits que vous envoyez à l'école ;
- Évitez d'envoyer _____ ou des produits contenant _____ à l'école.
- Apprenez à votre enfant qu'il s'agit d'une situation très grave et dissuadez-le de taquiner son camarade allergique.

Nous savons que ces précautions entraîneront quelques inconvénients, mais nous espérons que vous comprendrez combien votre aide est importante. Sachez que nous prendrions autant de précautions à l'égard de votre enfant si celui-ci était atteint d'une telle affection.

Merci à l'avance de votre soutien. Pour obtenir un complément d'information, veuillez téléphoner au : _____

Agréer, chers parents ou tuteurs, mes salutations les plus cordiales.

La directrice/Le directeur

Date : _____

Allergies aux produits contenant des arachides et des noix

Chers parents,

Un élève de notre école/classe a une allergie potentiellement mortelle aux arachides et à tous les fruits à coque (noix, etc.) Si du beurre d'arachide ou même la quantité la plus minuscule d'arachides ou de tout autre type de fruits à coque pénètrent dans son corps (par les yeux, le nez ou la bouche), il subit une réaction très grave. Son visage enfle et une urticaire apparaît, sa gorge gonfle et se resserre. En l'absence de traitement médical immédiat, il pourrait mourir en quelques minutes.

Après discussion avec le personnel de l'école et des spécialistes dans les milieux médicaux, il a été suggéré que le meilleur moyen d'assurer la sécurité de _____ serait de demander votre aide afin que sa classe devienne un « environnement sans arachides et sans noix ». Ceci veut dire que chaque élève qui sera dans sa classe est prié de n'apporter à l'école que des goûters et des repas sans arachides ou noix. Cela peut paraître simple, mais cela veut dire qu'il faudra éviter les sandwiches et les biscuits au beurre d'arachide. Vous devrez vérifier les étiquettes des autres produits alimentaires comme les muffins, les tablettes granolas et les céréales avant de les inclure dans le goûter de votre enfant. Nous devons être particulièrement vigilants à l'égard des aliments qui peuvent contenir des arachides ou des noix parmi les ingrédients « cachés », et qui peuvent donc entraîner une contamination croisée.

Nous savons que cette demande entraînera pour vous certains inconvénients puisqu'elle compliquera la préparation du goûter et du repas de votre enfant. Nous sommes très reconnaissants de votre soutien et de votre compréhension face à cette allergie potentiellement mortelle.

Veuillez accepter, chers parents, nos salutations les meilleures.

La directrice/Le directeur

✂ Veuillez retourner cette partie à l'enseignante ou l'enseignant de la classe

Nous, parent/tuteur de _____ avons reçu et lu la lettre relative à un élève ayant une allergie potentiellement mortelle.

Signature du parent/tuteur

Date

Date : _____

Objet : Remerciement
Allergies aux produits contenant des arachides et des noix

Chers parents,

Nous tenons à vous remercier de votre compréhension et votre collaboration suite à la demande d'éviter des produits contenant des arachides et des noix. Nous avons effectivement constaté une réduction de la quantité de produits d'arachide et de noix apportés par les enfants à l'école dans leur goûter et leur dîner. Nous vous encourageons à poursuivre vos efforts afin d'éviter ces produits dans les aliments que votre enfant apporte à l'école.

Une quantité minuscule de la substance allergène peut causer une réaction potentiellement mortelle. La meilleure méthode afin de prévenir une réaction grave à l'école consiste donc à éviter ces substances dans la classe.

Si votre enfant apporte à l'école un aliment qui contient des arachides ou des noix, veuillez lui demander d'en informer l'enseignante ou l'enseignant.

Nous vous remercions à nouveau de votre collaboration face à cette importante question.

Veuillez agréer, chers parents, l'expression de nos sentiments distingués.

La directrice/Le directeur

ANNEXE 3

OUTILS DIVERS

Utilisation de votre auto-injecteur

RETIREZ L'AUTO-INJECTEUR EPIPEN[®] DE SON TUBE DE RANGEMENT.



Tenez-le fermement, le bout orange pointant vers le bas.

Enlevez le bouchon de sécurité bleu



Poussez fermement le bout orange dans le milieu du côté extérieur de la cuisse jusqu'à ce que vous entendiez le « clic ».

Le retenir sur la cuisse pendant plusieurs secondes



Protection intégrée contre l'aiguille

Le couvre-aiguille orange s'étend automatiquement pour couvrir l'aiguille d'injection quand EpiPen[®] est retiré.

Suite à l'administration, vous devriez avoir immédiatement recours aux soins d'un médecin ou vous rendre à la salle d'urgence la plus proche. Pour les 48 prochaines heures, assurez-vous de demeurer à proximité d'un établissement de santé ou d'un endroit d'où vous pouvez composer le 911.

Allerject

Il parle.

Le seul auto-injecteur d'épinéphrine doté d'instructions vocales qui vous guident durant tout le processus d'injection.

En cas de réaction allergique, l'épinéphrine doit être administrée immédiatement. Si la réaction allergique est grave et persistante, vous pourriez avoir besoin d'une dose supplémentaire d'épinéphrine. L'administration séquentielle de plus de 2 doses d'épinéphrine ne doit être effectuée que sous surveillance médicale directe.

Toute personne traitée d'urgence par l'épinéphrine doit immédiatement être transportée à l'hôpital, de préférence en ambulance, aux fins d'évaluation et d'observation. Les patients doivent rester à proximité d'un hôpital ou dans un endroit où ils peuvent appeler le 911 au cours des 48 heures suivant le traitement médical.



Visualiser notre vidéo



Boîtier de transport Allerject^{MC}



Twinject

UTILISATION DE VOTRE AUTO-INJECTEUR TWINJECT®


ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DE L'AUTO-INJECTEUR

Examinez l'auto-injecteur Twinject 0.3 mg ou Twinject 0.15 mg régulièrement. Le médicament peut ne pas être efficace si la solution est trouble (contient des particules), rosâtre ou d'un jaune plus foncé que jaune clair, ou si la date d'expiration est échuë.


En cas de réaction allergique qui met la vie en danger, si vous n'avez qu'un auto-injecteur dont la date d'expiration est échuë, vous devez quand même vous en servir. NE retirez PAS les capuchons VERTS qu'au moment de l'emploi.

ÉTAPE 2 – PREMIÈRE DOSE

1. Retirez le premier capuchon VERT (1) pour exposer le capuchon ROUGE. **Ne mettez jamais le doigt ou la main sur le capuchon ROUGE.**



2. Retirez le second capuchon VERT (2).



3. Mettez le capuchon ROUGE en contact avec le milieu de la cuisse (l'injection peut être donnée à travers les vêtements).




4. Appuyez fermement, jusqu'au déclenchement du mécanisme, puis comptez lentement jusqu'à dix.
5. Retirez l'auto-injecteur et examinez le capuchon ROUGE; si l'aiguille est exposée, vous savez que la dose a été administrée. Sinon, répétez les étapes 3 et 4.
6. Préparez l'auto-injecteur en vue de la seconde dose.

Assurez-vous d'appeler le 911 ou les services d'urgence les plus proches aussitôt que vous avez administré la première dose.

ÉTAPE 3 – DEUXIÈME DOSE

1. Dévissez et retirez le capuchon ROUGE. **Faites attention de ne pas vous piquer.**
2. En tenant l'embout BLEU à la base de l'aiguille, retirez la seringue de l'injecteur.



3. Retirez l'anneau JAUNE du piston.



4. **ATTENDEZ QUELQUES MINUTES.** Si les symptômes ne sont pas atténués environ 10 minutes après la première injection, passez aux étapes 5 et 6.
5. Insérez l'aiguille dans la cuisse.



6. Appuyez sur le piston jusqu'au fond.

Remettez votre Twinject épuisé à un professionnel de la santé afin qu'il en dispose. Ne le jetez pas aux vidanges.

Twinject®
auto-injecteur
(adrénaline USP pour injection 1:1000)
0,3 mg 0,15 mg



L'ANAPHYLAXIE

Procédure en cas d'urgence - Anaphylaxie AUTOBUS SCOLAIRE En cas d'urgence !

- 1. Mettre le véhicule en sécurité.
Mettre les passagers en sécurité.**
- 2. Administrer l'auto-injecteur**
Ne pas hésiter. Cette intervention peut sauver une vie.

Faire reposer l'élève.
- 3. Pour l'injection d'ÉpiPen**
 - ◆ Retirer l'auto-injecteur de l'étui.
 - ◆ Retirer le bouchon de sécurité bleu.
 - ◆ Enfoncez le bout orange de la seringue dans LE MILIEU DE LA PARTIE EXTÉRIEURE DE LA CUISSE de l'enfant, au besoin, à travers des vêtements légers ou une seule épaisseur de tissu (l'épaisseur maximum d'un jean). On entendra un déclic.
 - ◆ Attendre que le liquide ait pénétré dans le corps (attendre 10 secondes – éviter de compter trop vite).
 - ◆ L'enfant doit être emmené d'urgence à l'hôpital même après l'injection d'épinéphrine.
 - ◆ Noter l'heure à laquelle la première injection a été administrée afin que la seconde injection puisse être administrée dans les 10 à 15 minutes qui suivent, si les symptômes apparaissent de nouveau.
 - ◆ Placer l'auto-injecteur après utilisation dans un récipient en plastique aux parois suffisamment épaisses pour que l'aiguille ne les perce pas. Envoyer l'auto-injecteur usagé à l'hôpital avec l'élève.
- 4. Pour l'injection d'Allerject, suivre les indications vocales**
- 5. Faire appeler le 9-1-1**
Préciser que l'élève a subi une réaction anaphylactique.
Donner le nom et l'endroit où vous êtes (conformément aux instructions générales pour les appels 9-1-1).
- 6. Aider l'élève à rester calme et à respirer normalement.**
- 7. Observer et surveiller l'élève jusqu'à l'arrivée de l'ambulance.**
- 8. Ou se diriger vers l'hôpital le plus près tout en allant à la rencontre de l'ambulance.**

À afficher près du téléphone

Protocole pour les appels 9-1-1 - Anaphylaxie

- 1. Numéro de téléphone d'urgence : 9-1-1**
- 2. S'identifier**
Bonjour, je m'appelle _____
- 3. Voici l'endroit où nous sommes :**
Adresse : _____
Intersection la plus proche : _____
- 4. Préciser :**
« Nous avons besoin d'une ambulance immédiatement. Un enfant a subi une réaction anaphylactique. Nous administrons l'auto-injecteur (d'épinéphrine) maintenant. »
- 5. Fournir les renseignements suivants sur l'état de l'enfant :**
 - Degré de conscience
 - Respiration
 - Œdème (enflure)
 - Âge
- 6. Mon numéro de téléphone est le _____**
- 7. L'accès le plus proche pour une ambulance est _____**
- 8. Avez-vous besoin d'autres renseignements ?**
- 9. Combien de temps prendrez-vous pour arriver ?**
- 10. Préciser :**
« Un membre du personnel vous attendra à l'entrée pour vous fournir d'autres renseignements. »
- 11. Contacter la personne responsable de l'enfant**
Communiquer avec les parents, le tuteur ou la personne-ressource en cas d'urgence.

Intervention lors d'anaphylaxie

Nom de l'élève : _____

École : _____

Classe : _____

Symptômes

- Urticaire et démangeaison sur n'importe quelle partie du corps ;
- Nausées, vomissements, diarrhée ;
- Respiration ou déglutition difficile;
- Panique ou sentiment apocalyptique ;
- Constriction ou resserrement de la gorge ;
- Enflure de n'importe quelle partie du corps, surtout des paupières, des lèvres, du visage ou de la langue ;
- Toux, respiration sifflante ou changement de la voix ;
- Évanouissement ou perte de conscience ;
- Autres, précisez : _____

Mesures d'urgence

Auto-injecteur administré le : _____

Heure : 1^{re} dose: _____
2^e dose: _____
3^e dose: _____

Ambulance appelée : 911

Urgence contactée : oui non

Parents avisés : oui non

Enfant à l'hôpital :

Accompagné par : _____ Heure: _____

Signature

Date